

- gonflement autour de la tête, du cou et des yeux;
- diarrhée ou mort subite;

La présence de plusieurs oiseaux morts au même endroit est un signe de la présence du virus.

Comme de nombreux Nunavummiut participent activement à la récolte d'oiseaux sauvages et d'œufs, il est important de connaître les principales précautions à prendre pour limiter la propagation des maladies et minimiser les risques pour les personnes. Les mesures de sécurité alimentaire de base recommandées aux chasseurs et aux autres personnes manipulant des oiseaux pour réduire le risque de maladie et de propagation du virus sont les suivantes :

- porter des gants;
- se laver les mains avec du savon et de l'eau chaude;
- nettoyer les vêtements et les équipements utilisés dès que possible;

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et le gouvernement du Nunavut ont élaboré des lignes directrices sur les pratiques à suivre visant à réduire le risque d'infection humaine, qui peuvent être consultées [ici](#).

Si vous remarquez qu'un oiseau meurt d'une façon inhabituelle ou qu'il semble malade, communiquez avec le bureau des agents de conservation. Si vous vous sentez très malade après avoir manipulé un oiseau, communiquez avec votre centre de santé. Pour d'autres informations, veuillez consulter le [site web](#) du gouvernement du Canada.

###

Relations avec les médias :

Chris Puglia
Gestionnaire des communications
Ministère de la Santé
867 975-5949
cpuglia@gov.nu.ca

ᐱᓄᓕᓕᓕᓕᓕ ᓂᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕ ᐱᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕ ᐱᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕ, ᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕ, ᐱᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕ ᐱᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕ ᐱᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕᓕ, www.gov.nu.ca.
News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca.
Tuhagtaghat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca.
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca.